

Computer Algebra

Sebastian Iwanowski
FH Wedel

5. Spezialthema: Primzahltest

Referenzen zum Nacharbeiten:

Köpf 4.6

Originalarbeit AKS

Reportage von Prof. Bornemann (DMV 2002)

Computer Algebra 5

Rabin-Miller-Test

Kleiner Satz von Fermat:

p Primzahl $\Rightarrow \forall a \in \mathbb{Z}_p: a^p \equiv a \pmod{p}$

$\exists a \in \mathbb{Z}_p: a^p \not\equiv a \pmod{p} \Rightarrow p$ zerlegbar

Solch ein a heißt *Fermatscher Zeuge*
für die Zerlegbarkeit von p

Die Umkehrung des Satzes von Fermat gilt nicht:

$\exists p \in \mathbb{N}: p$ zerlegbar $\wedge (\forall a \in \mathbb{Z}_p: a^p \equiv a \pmod{p})$

Solch ein p heißt
Carmichaelzahl

Charakterisierung der Carmichaelzahlen:

p Carmichaelzahl $\Leftrightarrow p = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$, alle p_i paarweise verschiedene Primzahlen
und $p_i - 1 \mid p - 1$ für alle p_i

Computer Algebra 5

Rabin-Miller-Test

p (ungerade) heißt strenge Pseudoprimzahl zur Basis a:

- i) $p-1 = 2^t \cdot u$
- ii) $\text{ggT}(p,a) = 1$
- iii) $a^u \equiv 1 \pmod{p}$ oder $\exists s \in \{0, 1, \dots, t-1\}: a^{2^s \cdot u} \equiv p-1 \pmod{p}$

Die Umkehrung des Satzes von Fermat gilt nicht:

$\exists p \in \mathbb{N}: p \text{ zerlegbar} \wedge (\forall a \in \mathbb{Z}_p: a^p \equiv a \pmod{p})$ Solch ein p heißt Carmichaelzahl

Charakterisierung der Carmichaelzahlen:

p Carmichaelzahl $\Leftrightarrow p = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$, alle p_i paarweise verschiedene Primzahlen
und $p_i - 1 \mid p - 1$ für alle p_i

Computer Algebra 5

Rabin-Miller-Test

p (ungerade) heißt strenge Pseudoprimzahl zur Basis a:

- i) $p-1 = 2^t \cdot u$
- ii) $\text{ggT}(p,a) = 1$
- iii) $a^u \equiv 1 \pmod{p}$ oder $\exists s \in \{0, 1, \dots, t-1\}: a^{2^s \cdot u} \equiv p-1 \pmod{p}$

Satz: Wird a zufällig gewählt, dann ist eine strenge Pseudoprimzahl zur Basis a mit Wahrscheinlichkeit $> \frac{3}{4}$ eine echte Primzahl

Korollar: Durch mehrfache Wahl von zufälligen Basen a kann für jede Zahl p durch den Pseudoprimzahltest mit beliebiger Wahrscheinlichkeit < 1 bestimmt werden, ob p Primzahl ist oder nicht

„Rabin-Miller-Test“

Computer Algebra 5

AKS-Test

Kleiner Satz von Fermat für Polynome:

$$p \text{ Primzahl} \iff \forall a \in \mathbb{Z}_p \quad \forall x \in \mathbb{Z}_p: (x+a)^p \equiv x^p + a \pmod{p}$$

Idee:

Finde ein r , das logarithmisch in p ist, mit

$$p \text{ Primzahl} \iff \forall a \in \mathbb{Z}_p \quad \forall x \in \mathbb{Z}_p: (x+a)^p \equiv x^p + a \pmod{x^r-1, p}$$

↑
Polynomdivision in \mathbb{Z}_p

Computer Algebra 5

AKS-Test

AKS-Algorithmus:

Eingabe: Zahl $p \in \mathbb{N}$

Ausgabe: **true** für “p ist Primzahl”, **false** für “p ist zusammengesetzt”

1. Wenn p Primzahlpotenz ($p = a^b$ für eine Primzahl a), return **false**
2. Suche das kleinste r , sodass in \mathbb{Z}_r gilt: $o(p) > (\log p)^2$ ($o_r(p)$ ist die Ordnung modulo r)
3. Wenn es ein $a \leq r$ gibt mit $\text{ggT}(a,p) > 1$, return **false**
4. Wenn $p \leq r$, return **true**
5. For $a := 1$ to $\sqrt{\varphi(r) \cdot \log(p)}$ do
 Wenn $(x+a)^p \not\equiv x^p + a \pmod{x^r-1, p}$, return **false**
6. return **true**

Satz (Korrektheit): p ist Primzahl \Leftrightarrow AKS-Algorithmus gibt **true** aus

Satz (Laufzeit): Der AKS-Algorithmus stoppt nach $O((\log p)^{11})$ Operationen.